

| レジメン名 | 薬剤情報 薬品名：数量 投与日 | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|--|
| | 薬品名 | 投与量 | day1 | day2 | day3 | day21 | |
| 【軟部】ADR | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】 | 1 A | ○ | ○ | ○ | | |
| | ドキシルピシン | 30 mg | ○ | ○ | ○ | | |
| | 休薬完了 | | | | | 休 | |
| | | | | | | | |
| 【軟部】IFM | 薬品名 | 投与量 | day1 | day2 | day3 | day21 | |
| | パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】 | 1 本 | ○ | | | | |
| | イホスファミド | 3 g/m ² | ○ | ○ | ○ | | |
| | 休薬完了 | | | | | 休 | |
| 【軟部】EPI*リン | 薬品名 | 投与量 | day1 | day8 | day21 | | |
| | エリプリンメシル | 1.4 mg/m ² | ○ | ○ | | | |
| | 休薬完了 | | | | 休 | | |
| | | | | | | | |
| 【軟部】トラベクテジン(ヨネテリス) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day21 | | | |
| | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】 | 1 A | ○ | | | | |
| | トラベクテジン | 1.2 mg/m ² | ○ | | | | |
| | 休薬完了 | | | 休 | | | |
| 【血管肉腫】PTX (80mg/m ²) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day8 | day15 | day28 | |
| | ファモチジン注【アンプル20mg】 | 1 A | ○ | ○ | ○ | | |
| | バクリタキセル | 80 mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | |
| | 休薬完了 | | | | | 休 | |
| 【血管肉腫】PTX (90mg/m ²) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day8 | day15 | day28 | |
| | ファモチジン注【アンプル20mg】 | 1 A | ○ | ○ | ○ | | |
| | バクリタキセル | 90 mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | |
| | 休薬完了 | | | | | 休 | |
| 【血管肉腫】PTX(100mg/m ²) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day8 | day15 | day28 | |
| | ファモチジン注【アンプル20mg】 | 1 A | ○ | ○ | ○ | | |
| | バクリタキセル | 100 mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | |
| | 休薬完了 | | | | | 休 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 【皮膚】アベルマブ (ルペンチオ) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day14 | | | |
| | アベルマブ | 10 mg/kg | ○ | | | | |
| | 休薬完了 | | | 休 | | | |
| 【原発不明】ニボルマブ (240mg2週毎) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day14 | | | |
| | ニボルマブ | 240 mg | ○ | | | | |
| | 休薬完了 | | | 休 | | | |
| 【原発不明】ニボルマブ (480mg4週毎) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day28 | | | |
| | ニボルマブ | 480 mg | ○ | | | | |
| | 休薬完了 | | | 休 | | | |
| 【脳】TMZ(内服) (初発) +Bmab(RT併用) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day15 | day29 | day43 | day70 |
| | ベバシズマブ | 10 mg/kg | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 休薬完了 | | | | | | 休 |
| | TMZ投与量 | | | | | | |
| | 75mg/m ² | | | | | | |
| | 6週間内服4週間休薬 | | | | | | |
| 【脳】TMZ(内服) (再発) +Bmab | 薬品名 | 投与量 | day1 | day15 | day28 | | |
| | ベバシズマブ | 10 mg/kg | ○ | ○ | | | |
| | 休薬完了 | | | | 休 | | |
| | TMZ投与量 | | | | | | |
| | 150mg/m ² | | | | | | |
| | 2コース目以降は200mg/m ² に増量可 5日間内服、23日間休薬 | | | | | | |
| 【MSI-High固形癌】ベムプロリスマブ (200mg3週毎) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day21 | | | |
| | ベムプロリスマブ点滴静注用 | 200 mg | ○ | | | | |
| | 休薬完了 | | | 休 | | | |
| 【MSI-High固形癌】ベムプロリスマブ (400mg6週毎) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day42 | | | |
| | ベムプロリスマブ点滴静注用 | 400 mg | ○ | | | | |
| | 休薬完了 | | | 休 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------|------|-------|
| 【TMB-High固形癌】 [△] [△] [△] [△] [△] [△] (200mg3週毎) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day21 |
| | ベムプロリスマブ点静注用 | 200 mg | ○ | |
| | 休薬完了 | | | 休 |
| | | | | |
| 【TMB-High固形癌】 [△] [△] [△] [△] [△] [△] (400mg6週毎) | 薬品名 | 投与量 | day1 | day42 |
| | ベムプロリスマブ点静注用 | 400 mg | ○ | |
| | 休薬完了 | | | 休 |
| | | | | |