

| レジメン名  | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  |                       |      |       |
|--|---|-----------------------|------|-------|
|  | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day21 |
| 【大腸】CAPOX  | グラニセロン 【アプ <sup>®</sup> ル3mg/3mL】   | 1 A                   | ○    |       |
|  | オキサリプラチン  | 130 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  | Cape投与量<br>2000mg/m <sup>2</sup> /日   |                       |      |       |
|  | 14日間服用、7日間休薬  |                       |      |       |
| 【大腸】CAPOX+Bmab   | グラニセロン 【アプ <sup>®</sup> ル3mg/3mL】   | 1 A                   | ○    |       |
|  | ベリズマブBS   | 7.5 mg/kg             | ○    |       |
|  | オキサリプラチン  | 130 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  | Cape投与量<br>2000mg/m <sup>2</sup> /日   |                       |      |       |
| 14日間服用、7日間休薬   |   |                       |      |       |
| 【大腸】CAPOX+Pmab   | グラニセロン 【アプ <sup>®</sup> ル3mg/3mL】   | 1 A                   | ○    |       |
|  | パニツムマブ  | 8 mg/kg               | ○    |       |
|  | オキサリプラチン  | 130 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  | Cape投与量<br>2000mg/m <sup>2</sup> /日   |                       |      |       |
| 14日間服用、7日間休薬   |   |                       |      |       |
| 【大腸】Cmab( 11-8目)+インテリニブ <sup>®</sup> +ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup>   | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day7  |
|  | セツキシマブ  | 400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  | インテリニブ <sup>®</sup> 1回300mgを1日1回連日投与 ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup> 1回45mgを1日2回連日投与 |                       |      |       |
| 【大腸】Cmab( 21-8目以降)+インテリニブ <sup>®</sup> +ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup> | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day7  |
|  | セツキシマブ  | 250 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  | インテリニブ <sup>®</sup> 1回300mgを1日1回連日投与 ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup> 1回45mgを1日2回連日投与 |                       |      |       |
| 【大腸】Cmab(11-8目)  | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day7  |
|  | セツキシマブ  | 400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
| 【大腸】Cmab(21-8目以降)  | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day7  |
|  | セツキシマブ  | 250 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |



|                            |                        |                        |      |       |       |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|-------|
| 【大腸】FL+Pmab                | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                            | パニツムマブ                 | 6 mg/kg                | ○    |       |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            |                        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        | 休    |       |       |
| 【大腸】FOLFIRI                | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                            | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | イリノテガン                 | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
| 2400 mg/m <sup>2</sup>     |                        | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        | 休    |       |       |
| 【大腸】FOLFIRI+Bmab           | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                            | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|                            | ペバシズマブBS               | 5 mg/kg                | ○    |       |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | イリノテガン                 | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
| フルオロウラシル                   | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○                      |      |       |       |
|                            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        | 休    |       |       |
| 【大腸】FOLFIRI+Cmab(1J-1目)    | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day8  | day14 |
|                            | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|                            | セツキシマブ                 | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            |                        | 250 mg/m <sup>2</sup>  |      | ○     |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
| イリノテガン                     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○                      |      |       |       |
| フルオロウラシル                   | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○                      |      |       |       |
|                            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】FOLFIRI+Cmab(2J-1目以降)  | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day8  | day14 |
|                            | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|                            | セツキシマブ                 | 250 mg/m <sup>2</sup>  | ○    | ○     |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | イリノテガン                 | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
| フルオロウラシル                   | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○                      |      |       |       |
|                            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】FOLFIRI+Cmab(biweekly) | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                            | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|                            | セツキシマブ                 | 500 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | イリノテガン                 | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
| フルオロウラシル                   | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○                      |      |       |       |
|                            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        | 休    |       |       |
| 【大腸】FOLFIRI+Pmab           | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                            | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|                            | パニツムマブ                 | 6 mg/kg                | ○    |       |       |
|                            | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                            | イリノテガン                 | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
| フルオロウラシル                   | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○                      |      |       |       |
|                            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了                       |                        |                        | 休    |       |       |

|                        |                          |                        |      |       |       |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------|-------|-------|
| 【大腸】FOLFIRI+RAM        | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                        | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】    | 1 A                    | ○    |       |       |
|                        | ラムシルマブ                   | 8 mg/kg                | ○    |       |       |
|                        | レボホリナート                  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | イリノテカン                   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | フルオロウラシル                 | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        |                          | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了                   |                          |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】FOLFIRI+ZAL        | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                        | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】    | 1 A                    | ○    |       |       |
|                        | アフリベルセプト・ベータ             | 4 mg/kg                | ○    |       |       |
|                        | レボホリナート                  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | イリノテカン                   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | フルオロウラシル                 | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        |                          | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了                   |                          |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】FOLFOXIRI          | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                        | パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】 | 1 本                    | ○    |       |       |
|                        | イリノテカン                   | 165 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | レボホリナート                  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | オキサリプラチン                 | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|                        | フルオロウラシル                 | 3200 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了                   |                          |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】FOLFOXIRI+Bmab     | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                        | パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】 | 1 本                    | ○    |       |       |
|                        | ベシズマブBS                  | 5 mg/kg                | ○    |       |       |
|                        | イリノテカン                   | 165 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | レボホリナート                  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | オキサリプラチン                 | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|                        | フルオロウラシル                 | 3200 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了                   |                          |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】IRIS               | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day15 | day28 |
|                        | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】    | 1 A                    | ○    | ○     |       |
|                        | イリノテカン                   | 125 mg/m <sup>2</sup>  | ○    | ○     |       |
|                        | 休薬完了                     |                        |      |       | 休     |
| S-1投与量                 |                          |                        |      |       |       |
| 80mg/m <sup>2</sup> /日 |                          |                        |      |       |       |
| 14日間服用、14日間休薬          |                          |                        |      |       |       |
| 【大腸】IRIS+Bmab          | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day15 | day28 |
|                        | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】    | 1 A                    | ○    | ○     |       |
|                        | ベシズマブBS                  | 5 mg/kg                | ○    | ○     |       |
|                        | イリノテカン                   | 100 mg/m <sup>2</sup>  | ○    | ○     |       |
|                        | 休薬完了                     |                        |      |       | 休     |
|                        | S-1投与量                   |                        |      |       |       |
| 80mg/m <sup>2</sup> /日 |                          |                        |      |       |       |
| 14日間服用、14日間休薬          |                          |                        |      |       |       |
| 【大腸】mFOLFOX6           | 薬品名                      | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|                        | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】    | 1 A                    | ○    |       |       |
|                        | レボホリナート                  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        | オキサリプラチン                 | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|                        | フルオロウラシル                 | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|                        |                          | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了                   |                          |                        |      | 休     |       |

|   |                        |                        |      |       |       |
|---|------------------------|------------------------|------|-------|-------|
| 【大腸】mFOLFOX6+Bmab                                   | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|   | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|   | ペバシズマブBS               | 5 mg/kg                | ○    |       |       |
|   | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | オキサリプラチン               | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|   | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   |                        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了  |                        |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】mFOLFOX6+Cmab(11-7日)                            | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day8  | day14 |
|   | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|   | セツキシマブ                 | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   |                        | 250 mg/m <sup>2</sup>  |      | ○     |       |
|   | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | オキサリプラチン               | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|   | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○                      |      |       |       |
| 休薬完了  |                        |                        |      |       | 休     |
| 【大腸】mFOLFOX6+Cmab(21-7日以降)                          | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day8  | day14 |
|   | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|   | セツキシマブ                 | 250 mg/m <sup>2</sup>  | ○    | ○     |       |
|   | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | オキサリプラチン               | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|   | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   |                        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了  |                        |                        |      |       | 休     |
| 【大腸】mFOLFOX6+Cmab(biweekly)                         | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|   | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|   | セツキシマブ                 | 500 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | オキサリプラチン               | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|   | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   |                        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了  |                        |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】mFOLFOX6+Pmab                                   | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|   | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|   | パニツムマブ                 | 6 mg/kg                | ○    |       |       |
|   | レボホリナート                | 200 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | オキサリプラチン               | 85 mg/m <sup>2</sup>   | ○    |       |       |
|   | フルオロウラシル               | 400 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   |                        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |       |
| 休薬完了  |                        |                        |      | 休     |       |
| 【大腸】mXELIRI+Bmab                                    | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day21 |       |
|   | グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】  | 1 A                    | ○    |       |       |
|   | ペバシズマブBS               | 7.5 mg/kg              | ○    |       |       |
|   | イリノテガン                 | 150 mg/m <sup>2</sup>  | ○    |       |       |
|   | 休薬完了                   |                        |      |       | 休     |
| Cape投与量<br>1600mg/m <sup>2</sup> /日<br>14日間内服、7日間休薬 |                        |                        |      |       |       |
| 【大腸】Pmab  | 薬品名                    | 投与量                    | day1 | day14 |       |
|   | パニツムマブ                 | 6 mg/kg                | ○    |       |       |
|   | 休薬完了                   |                        |      |       | 休     |

|                                  |                                  |         |                       |       |       |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| 【大腸】SIR                          | 薬品名                              |         | 投与量                   | day1  | day21 |
|                                  | グラニセロン【アンプル3mg/3mL】              |         | 1 A                   | ○     |       |
|                                  | イリノテガン                           |         | 150 mg/m <sup>2</sup> | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |
|                                  | S-1投与量<br>80mg/m <sup>2</sup> /日 |         |                       |       |       |
| 14日間内服、7日間休薬                     |                                  |         |                       |       |       |
| 【大腸】SIRB                         | 薬品名                              |         | 投与量                   | day1  | day21 |
|                                  | グラニセロン【アンプル3mg/3mL】              |         | 1 A                   | ○     |       |
|                                  | ペバシズマブBS                         |         | 7.5 mg/kg             | ○     |       |
|                                  | イリノテガン                           |         | 150 mg/m <sup>2</sup> | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |
| S-1投与量<br>80mg/m <sup>2</sup> /日 |                                  |         |                       |       |       |
| 14日間内服、7日間休薬                     |                                  |         |                       |       |       |
| 【大腸】SOX                          | 薬品名                              |         | 投与量                   | day1  | day21 |
|                                  | グラニセロン【アンプル3mg/3mL】              |         | 1 A                   | ○     |       |
|                                  | オキサリプラチン                         |         | 130 mg/m <sup>2</sup> | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |
|                                  | S-1投与量<br>80mg/m <sup>2</sup> /日 |         |                       |       |       |
| 14日間内服、7日間休薬                     |                                  |         |                       |       |       |
| 【大腸】SOX+Bmab                     | 薬品名                              |         | 投与量                   | day1  | day21 |
|                                  | グラニセロン【アンプル3mg/3mL】              |         | 1 A                   | ○     |       |
|                                  | ペバシズマブBS                         |         | 7.5 mg/kg             | ○     |       |
|                                  | オキサリプラチン                         |         | 130 mg/m <sup>2</sup> | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |
| S-1投与量<br>80mg/m <sup>2</sup> /日 |                                  |         |                       |       |       |
| 14日間内服、7日間休薬                     |                                  |         |                       |       |       |
| 【大腸】TAS-102+Bmab                 | 薬品名                              | 投与量     | day1                  | day15 | day28 |
|                                  | ペバシズマブBS                         | 5 mg/kg | ○                     | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |
|                                  | TAS-102 70mg/m <sup>2</sup> /日   |         |                       |       |       |
| d1-d5、d8-d12内服し、2週間休薬            |                                  |         |                       |       |       |
| 【大腸】Tmab+PER(13-18日)             | 薬品名                              |         | 投与量                   | day1  | day21 |
|                                  | ハーセプチン【規格なし】                     |         | 8 mg/kg               | ○     |       |
|                                  | ベルツズマブ                           |         | 840 mg                | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |
| 【大腸】Tmab+PER(23-1日以降)            | 薬品名                              |         | 投与量                   | day1  | day21 |
|                                  | ハーセプチン【規格なし】                     |         | 6 mg/kg               | ○     |       |
|                                  | ベルツズマブ                           |         | 420 mg                | ○     |       |
|                                  | 休薬完了                             |         |                       |       | 休     |

|  |   |                       |      |       |
|--|---|-----------------------|------|-------|
| 【大腸】化 <sup>レ</sup> リムマブ <sup>ホ</sup> + ニボルマブ <sup>ホ</sup>      | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day21 |
|  | ニボルマブ   | 240 mg                | ○    |       |
|  | イビリムマブ  | 1 mg/kg               | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
| 【大腸】ニボルマブ <sup>ホ</sup> (240mg2週毎)                              | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day14 |
|  | ニボルマブ   | 240 mg                | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  |   |                       |      |       |
| 【大腸】ニボルマブ <sup>ホ</sup> (480mg4週毎)                              | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day28 |
|  | ニボルマブ   | 480 mg                | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  |   |                       |      |       |
| 【大腸】Cmab( biweekly)+インコラフェニブ <sup>ホ</sup> +ピニメチニブ <sup>ホ</sup> | 薬品名   | 投与量                   | day1 | day14 |
|  | セツキシマブ  | 500 mg/m <sup>2</sup> | ○    |       |
|  | 休薬完了  |                       |      | 休     |
|  | <p>インコラフェニブ<sup>ホ</sup>1回300mgを1日1回連日投与 ピニメチニブ<sup>ホ</sup>1回45mgを1日2回連日投与</p> |                       |      |       |