

HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン）フォーミュラリー

第1推奨	アトルバスタチン錠 10mg	ストロング スタチン	脂溶性
	ロスバスタチンOD錠 2.5mg		水溶性
	ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg		脂溶性
第2推奨	プラバスタチンNa錠 10mg	スタンダードスタチン	水溶性

※院内未採用のシンバスタチン、フルバスタチンからの切り替えは以下の換算表を参考にしてください。（換算量はあくまで目安であり、個人により反応性は異なります。）
切り替え時には、適応症、相互作用、腎機能を確認し、切り替え前後には、肝機能をモニターしてください。

薬品名			LDL-C低下作用比較(1日量)					
アトルバスタチン	ストロング スタチン	脂溶性			10mg	20mg	40mg	
ロスバスタチン		水溶性			2.5mg	5mg	10mg	20mg
ピタバスタチンCa		脂溶性		1mg	2mg	4mg		
プラバスタチンNa	スタンダード スタチン	水溶性	10mg	20mg				
(院内未採用)シンバスタチン		脂溶性	5mg	10mg	20mg			
(院内未採用)フルバスタチン		脂溶性	20mg	40mg	80mg*			

※本邦承認用量超過